

## Zdravotní překážky darování krve

### ODBĚR JE MOŽNÝ NEJDŘÍVE ZA:

<b>24 hod</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po <b>očkování</b> proti tetanu, chřipce, žloutence A, meningokoku, pneumokoku, klíšťové encefalitidě, karcinomu děložního čípku, choleře</li><li>• po malém nekrvavém ošetření <b>zubů</b> stomatologem či zubním hygienikem</li></ul>
<b>7 dnů</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po zhojení ambulantně provedeného chirurgického zákroku (šití drobné rány, odstranění stehů atd. – <b>malé chirurgické výkony</b> v místním znecitlivění)</li><li>• po <b>vytržení zubu</b> bez infekční komplikace (bez antibiotické terapie), kořenová výplň</li><li>• po očkování proti koronaviru SARS CoV-2 (vakcíny Pfizer, Moderna, Novavax, Sanofi)</li></ul>
<b>14 dnů</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po uzdravení z <b>kašle, chřipky, horečky, průjmu</b></li><li>• po dobrání <b>antibiotik</b></li><li>• po výsevu <b>oparu</b>, pokud je zhojen</li></ul>
<b>1 měsíc (28 dní)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po přísátí <b>klíštěte</b>, nebyla-li reakce (kožní změny nebo zvýšená teplota až horečka)</li><li>• po <b>očkování</b> proti koronaviru SARS CoV-2 (vakcíny Astra Zeneca, Johnson&amp;Johnson), tuberkulóze, zarděnkám, spalničkám, obrně (p.o.), příušnicím, žluté zimnici, žloutence typu B</li><li>• po <b>kontaktu s infekční</b> chorobou, pokud není znám původce infekce</li><li>• po <b>návratu z mimoevropské země</b>, kde se nevyskytuje malárie a/nebo evropské země s rizikem přenosu západonilské horečky (viz seznam <b>zemí s rizikem WNV</b>), pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 1 měsíce od návratu</li><li>• ledvinová <b>kolika</b></li><li>• po vysazení některých <b>léků</b> používaných k léčbě <b>zvětšené prostaty</b></li></ul>
<b>2 měsíce</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po kontaktu s infekční <b>žloutenkou</b> typu A nebo E</li></ul>

<b>6 měsíců</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po <b>operaci</b>, po katetrizaci, po invazivních vyšetřovacích nebo léčebných metodách</li><li>• po <b>transfuzi</b></li><li>• po konzervativním залéčení <b>vředové</b> choroby žaludku</li><li>• po <b>endoskopickém</b> vyšetření nebo zákroku (gastroskopie, kolonoskopie, artroskopie, atd.)</li><li>• po akupunktuře, <b>tetování, piercingu</b>, propichování uší</li><li>• po kontaktu se <b>žloutenkou</b> typu B, C (člen domácnosti, sexuální kontakt)</li><li>• po <b>poranění</b>, potřísnění sliznice či poraněné kůže potencionálně <b>infekčním</b> biologickým materiálem (např. krví)</li><li>• po ukončení léčby <b>boreliózy</b></li><li>• po návratu z <b>malarické</b> oblastí (většina zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky), pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 6 měsíců od návratu</li><li>• po <b>porodu</b> či předčasném ukončení těhotenství</li><li>• po pobytu ve <b>vězení</b></li><li>• po klinickém uzdravení z <b>toxoplazmózy</b></li></ul>
<b>1 rok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po uzdravení ze <b>septického</b> stavu</li><li>• po vyléčení <b>kapavky</b> či <b>syfilis</b></li><li>• po úplném uzdravení z <b>infekční mononukleózy, klíšťové encefalitidy</b></li><li>• po vyléčení infekční <b>žloutenky</b> typu A nebo E</li><li>• po očkování proti <b>vzteklině</b> po pokousání zvířetem</li><li>• po některých lécích na <b>akné</b></li></ul>
<b>2 roky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po uzdravení z brucelózy, listeriózy, tularemie, horečky Q, plicní tuberkulózy</li><li>• po vyléčení bazaliomu (kožní nádor)</li></ul>
<b>3 roky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po ukončení léčby epilepsie bez klinických projevů</li></ul>
<b>-</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• po odstranění sádrové dlahy na dolní končetině</li></ul>

*V případě nejistoty, prosíme, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem transfuzního oddělení nejlépe ještě před rozhodnutím přijít darovat krev.*

**Kontakt:** evidence dárců krve = 477 113 468, 477 113 437