

# **Předoperační autologní odběr (autotransfuze)**

## **Informace pro pacienty**

březen 2008

## **1. Co je to autotransfuze?**

Autotransfuze je odběr vlastní krve pacienta před operací, v průběhu či po operaci a její podání pacientovi během operace či po operaci. Nejběžnějším typem autotransfuze je předoperační autologní odběr, kdy se krev odebírá ve zhruba týdenních intervalech, obvykle 1-3x.

## **2. Jaké jsou výhody autotransfuze?**

- prevence přenosu infekčních chorob - třebaže je krev dárců krve vyšetřována, riziko přenosu infekce není zcela vyloučeno,
- snížení výskytu nežádoucích reakcí, které se mohou objevit po podání cizí krve (např. horečnaté stavy),
- možnost podání transfuze pacientům, jejichž obranyschopný aparát brání podání cizí krve,
- prevence možného působení cizí krve na obranyschopný aparát příjemce,
- možnost podání pacientům, kteří odmítají cizí krev.

## **3. Jaké jsou nevýhody a rizika autotransfuze?**

- odběry autologní krve jsou vhodné jen pro některé druhy operací a jen za určitých zdravotních podmínek pacienta,
- je nutné absolvovat odběr či několik odběrů vlastní krve,
- je možná záměna transfuzního přípravku a/nebo příjemce (stejně riziko je i u podání cizí krve),
- jsou možné (i když velmi vzácné) i reakce po podání vlastní krve,
- jsou možné nežádoucí reakce či komplikace při odběru vlastní krve (např. mdloby, modrina v místě vpichu, velmi vzácně se, především u starších lidí s nemocným srdcem, mohou vyskytnout i těžké komplikace).

## **4. Je autotransfuze vhodná pro všechny druhy operací?**

Ne. Vhodnost vždy musí posoudit ošetřující lékař.

## **5. Je autotransfuze vhodná pro všechny pacienty?**

Autotransfuzi lze provést prakticky bez ohledu na věk pacienta, od dětského až po pokročilý věk. Nezbytné je vyšetřit koncentraci červeného krevního barviva - hemoglobinu - v žilní krvi pacienta, která nesmí klesnout pod určitou minimální hranici. Dále je důležitý dostatečný žilní přístup, tj. možnost provést vpich do žily pacienta, umožňující odběr krve.

**Před odběrem se doporučuje provést základní interní vyšetření.**

## **6. Jak probíhá odběr vlastní krve (předoperační autologní odběr)?**

### Příprava k odběru

- doporučení ošetřujícího nebo odborného lékaře (žádanka),
- vyšetření před odběrem (především červené krevní barvivo, krevní tlak, puls),
- souhlas s odběrem,
- vypít dostatek tekutin (např. čaj, minerální voda apod. - ne alkohol), je možná i lehká snídaně s nízkým obsahem tuku.

### Vlastní odběr

Odebírá se přibližně 450 ml krve, odběr trvá zhruba 5-10 minut. Na případnou nevolnost či jiné nepříjemné pocity během odběru je třeba ihned upozornit personál, přítomný odběru. Po odběru je vhodné jen zvolna vstávat z odběrového křesla či lůžka a odejít domů až za minimálně 20-30 minut, nejlépe v doprovodu jiné osoby. Bezprostředně po odběru není vhodné řídit dopravní prostředek.

## **7. Zpracovává se dále odebraná krev?**

Krev, odebraná do protisrážlivého roztoku, se bud' dále nezpracovává, nebo se rozděluje na koncentrát červených krvinek a plazmu (tekutá část krve). Krev a koncentrát červených krvinek se skladují při chladničkové teplotě, maximálně 35 (krev) či 42 (červené krvinky) dní.

## **8. Vyšetřuje se odebraná krev, přestože se podává zpět dárci-pacientovi?**

Ano. Mezi povinná vyšetření vlastní krve patří vyšetření na zjištění původce AIDS (HIV), infekčních zánětů jater („žloutenky“) typu B a C a pohlavní choroby syfilis (příjice).

V případě, že výsledek některého z výše uvedených vyšetření není negativní, nelze krev (transfuzní přípravek) podat ani pacientovi, kterému byla tato krev odebrána a je nutné v případě potřeby transfuze podat transfuzní přípravek, vyrobený z krve odebrané dobrovolnému dárci.

## **9. Podává se odebraná krev vždy?**

Odebraná krev (přesněji transfuzní přípravky z ní vyrobené) se podává pouze tehdy, vyžaduje-li to velikost krevní ztráty. Nepodanou krev nelze použít pro jiného příjemce a je nutné ji likvidovat.

V některých případech však může být krvácení při operaci nebo po ní tak silné, že pro jeho nahradu nemusí stačit odebrané množství vlastní krve pacienta a je nezbytné podat transfuzní přípravek dárce krve.

## **10. Co vzít s sebou k odběru krve?**

- žádanku o autotransfuzi (autologní odběr) od indikujícího lékaře,
- výsledek interního vyšetření.



*Transfuzní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.*

*Předoperační autologní odběr (autotransfuze) - informace pro pacienty*

*verze: 1.1*

*platnost od: 1.3.2008*

*počet stran: 4*

*Autor, ověřil a schválil: prim. MUDr. Jiří Masopust*